

شماره ۱۱۸، بهار ۱۳۹۷

صص: ۲۶۶-۲۵۲

## استفاده از پودر شفیره کرم ابریشم

### به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره مرغ‌های تخم‌گذار تجارتی

#### زنیت شاه ماری

دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

#### شهاب قاضی هرسینی

دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

#### سودابه مرادی (نویسنده مسئول)

استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۹۶      تاریخ پذیرش: مهر ۱۳۹۶

شماره تماس نویسنده مسئول: ۰۸۳۳۸۳۲۳۷۲۸

Email: s.moradi@razi.ac.ir

#### چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر عملکرد تولیدی و ویژگی‌های کیفی تخم مرغ در مرغهای تخم‌گذار انجام شد. تعداد ۱۸۰ قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۶ تکرار از سن ۶۹ تا ۸۱ هفتگی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره کنتول بر اساس ذرت و کنجاله سویا و چهار جیره آزمایشی که به ترتیب ۵، ۷/۵، ۱۰، ۱۲/۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم، در آن به کاربرده شده بود. همه جیره‌های آزمایشی از نظر محتوای اتریزی، پروتئین و اسیدهای آمینه مشابه بودند. استفاده از سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم، تأثیر معنی‌داری بر وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل خوراک و درصد تولید تخم مرغ (روز مرغ) در کل دوره آزمایش نداشت. میانگین مصرف خوراک روزانه در طول دوره آزمایش در تیمار حاوی ۱۰ درصد پودر شفیره کرم ابریشم، افزایش معنی‌داری نشان داد ( $P \leq 0.05$ )، همچنین به کاربردن ۷/۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم، منجر به بهبود توده تخم مرغ در ۱۲ هفته طول دوره آزمایش گردید ( $P \leq 0.05$ ). تیمارهای مختلف بر صفات کیفی تخم مرغ، شامل وزن زرد، وزن سفید، درصد تخم مرغ شکسته، لمبه و غیرطبیعی، شاخص زرد، شاخص شکل تخم مرغ، درصد وزنی پوسته، ضخامت پوسته، واحد هاو و وزن مخصوص تخم مرغ، تأثیر معنی‌دار نداشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که می‌توان از پودر شفیره کرم ابریشم به عنوان یک منبع پروتئین حیوانی مناسب تا سطح ۱۲/۵ درصد، بدون مشاهده تأثیر منفی بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در جیره مرغان تخم‌گذار استفاده نمود.

**واژه‌های کلیدی:** مرغ تخم‌گذار؛ پودر شفیره کرم ابریشم؛ عملکرد؛ صفات کیفی تخم مرغ

Animal Science Journal (Pajouhesh &amp; Sazandegi) No 118 pp: 257-266

**The effect of using silk worm pupae powder as a partial replacement for soybean meal in commercial laying hen diets**By: Shahmari<sup>1</sup>, Z., Ghazi Harsini<sup>2</sup>, S., Moradi<sup>3</sup>, S

1: MSc Graduate Student, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

2,3: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

**Received: May 2017****Accepted: October 2017**

The experiment was conducted to evaluate the effects of inclusion of silkworm pupae powder meal on the productive performance and egg qualitative traits of laying hens. A total of 184 Lohmann LSL laying hens was used in a completely randomized design with 5 treatments, each replicated 6 times. Dietary treatments were: control diet (based on corn and soybean meal) and four diets by inclusion of 5, 7.5, 10 and 12.5% of silkworm pupae meal powder. All diets were supplied an equal amount of AME, crude protein and amino acids. For the entire experimental period, egg weight, feed conversion ratio and hen-day egg production rate were not affected by dietary treatments. However, feed intake was significantly higher for hens fed 10% of silkworm pupae powder compared to control ( $P \leq 0.05$ ). The inclusion of silkworm pupae powder up to 7.5% significantly improved egg mass ( $P \leq 0.05$ ) during 12 wk of the trial. None of the egg quality variables studied including albumin weight, yolk weight, abnormal and broken eggs, yolk index, egg shape index, shell weight, shell thickness, haugh unit and specific gravity was affected by dietary treatments. It is concluded that silkworm pupae powder can be used as a partial replacement for soybean meal up to 12.5% in laying-hen diets without negatively affecting bird performance and egg quality characteristics.

**Key words:** laying hens; silkworm pupae powder; performance; egg quality traits.

**مقدمه**

ابریشم، از ادامه رشد شفیره با استفاده از جوشاندن جلوگیری می‌شود، سپس خشک شده و قبل از اینکه آنزیم آزاد شود در محلول هیدروکسید سدیم غوطه ور می‌شود (Jintasataporn, ۲۰۱۲؛ Dutta و همکاران، ۲۰۱۲). شفیره مهم ترین پسماند صنعت تولید ابریشم می‌باشد، برای تولید هر کیلوگرم ابریشم خام، ۸ کیلوگرم شفیره مرطوب یا ۲ کیلوگرم شفیره خشک تولید می‌شود که معمولاً یا دور ریخته می‌شود یا به عنوان بارور کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنین می‌توان جهت استحصال روغن از آن استفاده کرد (Patil و همکاران، ۲۰۱۲). شفیره کرم ابریشم یک منبع پروتئینی جدید در تغذیه حیوانات است که به مقادیر زیادی در چین، هند و ژاپن تولید می‌شود. تولید جهانی شفیره تازه، ۳۲۴ هزارتن و شفیره خشک ۶۵ هزارتن در سال ۲۰۱۱ بوده است

بودر شفیره کرم ابریشم یک منع غنی پروتئینی با ارزش تغذیه‌ای بالا می‌باشد و سالانه به میزان قابل توجهی به عنوان یکی از محصولات جانبی صنعت ابریشم در ایران تولید می‌شود. از این ماده غذایی برای چندین سال است که در بسیاری از کشورهای آسیایی جهت تغذیه حیوانات تک مدهای و یا نشخوار کنندگان استفاده می‌شود (Blair و Ravindran, ۱۹۹۳).

حدود ۹۰ درصد از تولید جهانی شفیره مربوط به پیله گونه پروانه اهلی شده *Bombyx Mori* می‌باشد. وقتی کرم ابریشم وارد مرحله شفیرگی می‌شود یک پیله محافظت کننده به دور خود می‌سازد که در آخر مرحله شفیرگی، آنزیمی آزاد می‌کند که در پیله سوراخی ایجاد کرده و پروانه خارج می‌شود. به منظور تولید

جهت عادت‌پذیری با جیره‌های مصرفی انجام گرفت. مرغ‌های مورداستفاده در این آزمایش تولید تقریباً یکسان و دامنه وزنی ۱/۵۲ تا ۱/۵۹ کیلوگرم داشتند. برنامه نوری در سالن به مدت ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی در طول شباهنروز اعمال شد. دمای سالن در محدوده ۱۸-۲۱ درجه سانتی‌گراد حفظ گردید. این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار آزمایشی شامل سطوح صفر، ۵، ۷/۵، ۱۰ و ۱۲/۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم در جیره باع تکرار و ۶ قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد. پودر شفیره کرم ابریشم (روغن‌گیری نشده) از کارخانه تولید ابریشم استان گیلان تهیه و آسیاب گردید. آنالیز شفیره کرم ابریشم شامل ماده خشک، فیبر خام، پروتئین خام، چربی خام و خاکستر با ۳ تکرار آزمایشگاهی به روش AOAC (۱۹۹۵) انجام شد. میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم با روش جذب اتمی اندازه گیری شد (Murthy و همکاران، ۱۹۷۱). آنالیز اسیدهای آمینه در مطالعه قبلی (نقدی و همکاران، ۱۳۹۳) با روش اسپکتروفوتومتری (امواج نزدیک مادون قرمز، NIR) و توسط شرکت ایوانیک-دگوسا اندازه گیری شد که در تنظیم جیره‌ها لحاظ گردید و جیره‌های آزمایشی بر اساس احتیاجات راهنمای مرغ لوهمن (LSL-lite) و بر اساس آنالیز پودر شفیره کرم ابریشم تنظیم شدند. جیره‌های غذایی و ترکیبات شیمیایی آن‌ها از هفته ۶۹ تا پایان هفته ۸۱ در جدول ۱ گزارش شده است. همه جیره‌های آزمایشی از نظر انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی مشابه بودند. آب و خوراک به صورت آزاد در طول دوره آزمایش در اختیار مرغها قرار گرفت. تعداد تخم مرغ‌های تولیدی و وزن تخم مرغ به صورت روزانه ثبت و تولید تخم مرغ به صورت هفتگی بر اساس روز مرغ محاسبه گردید. مصرف خوراک، توده تخم مرغ (گرم/ مرغ/ روز) و ضریب تبدیل خوراک (گرم خوراک به گرم تخم مرغ تولیدی) به صورت هفتگی اندازه گیری و محاسبه گردید. در صورت وجود تلفات در واحدهای آزمایشی، ثبت و کالبدشکافی گردید. تعداد تخم مرغ‌های لمبه و بدون پوسته، شکسته و غیر طبیعی و بدشکل نیز به صورت جداگانه در هر روز برای تمامی واحدهای آزمایشی ثبت شد. کیفیت تخم مرغ سه بار در طول دوره آزمایش اندازه گیری شد، بطوریکه در سنین ۷۷، ۷۳ و ۸۱ هفتگی، تمامی تخم مرغ‌های تولیدی در دو روز آخر هر هفته جمع آوری و کیفیت سفیده (واحد هاو)، کیفیت

Food and Drug administration) شفیره کرم ابریشم از ۵۰ درصد ماده خشک تا ۸۰ درصد ماده خشک در شفیره چربی گیری شده متغیر می‌باشد. میزان لیزین ۷-۶ درصد پروتئین) و متیونین (۳-۲ درصد پروتئین) بالا می‌باشد. هر چند که پروتئین واقعی (مجموع کل اسیدهای آمینه) در کرم ابریشم حدود ۷۳ درصد کل پروتئین خام است که بقیه آن مربوط به حضور کیتین حاوی نیتروژن است (Finke، ۲۰۰۲). بر اساس بررسی منابع انجام شده، تحقیقات محدودی در مورد تغذیه شفیره کرم ابریشم در تک معده ای ها انجام شده و بیشتر تحقیقات بر جایگزین کردن شفیره کرم ابریشم به جای تمام یا قسمتی از پودر ماهی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار متتمرکز شده است. برخی محققین گزارش کردند که شفیره کرم ابریشم می‌تواند یک جایگزین عالی برای پودر ماهی در جیره آغازین جوجه‌های گوشتی باشد (Ijiiya و Eko، ۲۰۰۹). در آزمایشی که Khatun و همکاران (۲۰۰۵) بر روی طیور تخم‌گذار انجام دادند گزارش دادند که استفاده از ۶ درصد شفیره کرم ابریشم در جیره غذایی تأثیر مثبتی بر عملکرد تولید تخم مرغ نسبت به گروه بدون شفیره و سطح ۸ درصد شفیره دارد و با افزایش سطح شفیره کرم ابریشم هزینه خوراک به تدریج کاهش یافته و پرندگان دریافت کننده شفیره کرم ابریشم بازده بهتری نسبت به شاهد نشان دادند، اما Virk (۱۹۸۰) گزارش کرد که با افزایش سطح شفیره کرم ابریشم، تولید تخم مرغ کاهش می‌یابد. نتایج مطالعات شفیره کرم ابریشم در مرغ‌های تخم‌گذار محدود و متناقض می‌باشد و با جیره‌های حاوی پودر ماهی، این مقایسات صورت گرفته است، همچنین تأثیر جایگزینی استفاده از شفیره کرم ابریشم بر خصوصیات کیفی تخم مرغ تا کنون بررسی نشده است، لذا این مطالعه با هدف آنالیز شیمیایی پودر شفیره کرم ابریشم و بررسی امکان استفاده از آن به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در مرغان تخم‌گذار تجاری و اندازه گیری صفات عملکردی و کیفیت تخم مرغ انجام شد.

## مواد و روش‌ها

### پرنده‌ها و تیمارهای آزمایشی

در این تحقیق، تعداد ۱۸۰ قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن (LSL-Lite) در سن ۶۹ هفتگی، به مدت ۱۲ هفته مورد آزمایش قرار گرفت، قبل از شروع آزمایش یک دوره ۱۴ روزه

داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS (۹/۴) و رویه GLM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و میانگین تیمارها توسط آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد با یکدیگر مقایسه شدند.

پوسته (وزن و ضخامت پوسته)، رنگ زرده، وزن مخصوص تخم مرغ (گراویتی)، شاخص زرده، شاخص شکل تخم مرغ، وزن زرده و وزن سفیده بیتل گردید (Grobas و همکاران، ۲۰۰۱).

تجزیه و تحلیل داده‌ها

این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار آزمایشی، ۶ تکرار به ازاء هر تیمار و ۶ قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد.

## جدول ۱: ترکیب و آنالیز جیرهای آزمایشی

ترکیبات (درصد)	کترول	% شفیره	۷/۵	% شفیره	۱۰٪/شفیره	۱۲/۵٪/شفیره
ذرت (CP=7.5%)	۶۲/۱۱	۶۵/۶۴	۶۴/۵	۶۳/۲۱	۶۹/۲۱	۶۲
کنجاله سویا (CP=44%)	۲۴/۴۸	۱۷/۶۸	۱۴/۰۴	۱۰/۳۳	۹/۹۱	۰
روغن سویا	۱/۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
دی کلسیم فسفات	۱/۶۸	۱/۵۳	۱/۵۸	۱/۳۲	۱/۲۱	۰/۱۹
کربنات کلسیم	۴/۷	۴/۷	۴/۷	۴/۷	۴/۷	۰/۱۹
نمک	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۱۹	۰/۱۸	۰/۱۹
بی کربنات سدیم	۰/۱۷	۰/۱۸	۰/۱۸	۰/۱۸	۰/۱۸	۰/۵
مکمل ویتامینه و معدنی	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۱۰	۱۰	۱۲/۵
شفیره کرم ابریشم (CP=55.8%)	۰	۵	۷/۵	۱۰	۱۰	۰/۰۲
L-لیزین هیدرو کلراید	۰	۰	۰	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۵
-DL-میتوئین	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۶	۵/۰۲	۵/۰۲	۷/۵
سبوس گندم	۰	۰/۱۱	۰/۱۱	۴/۸۹	۴/۸۹	۴/۸۸
صفد دریایی	۴/۷۵	۴/۷۵	۴/۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
انرژی قابل متابولیسم (کیلو کالری / کیلو گرم)	۲۷۲۰	۲۷۲۰	۲۷۲۰	۲۷۲۰	۲۷۲۰	۲۷۲۰
پروتئین خام (درصد)	۱۶/۱۵	۱۶/۱۵	۱۶/۱۵	۱۶/۱۵	۱۶/۱۵	۱۶/۱۵
کلسیم (درصد)	۴	۴	۴	۴	۴	۴
فسفر قابل دسترس (درصد)	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸
میتوئین (درصد)	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸
میتوئین+سیستین (درصد)	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷
لیزین (درصد)	۰/۷۶	۰/۷۶	۰/۷۶	۰/۷۶	۰/۷۶	۰/۷۶

۱. هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی شامل: ۳۳۰۰ میلی گرم آهن، ۸۸۰۰ میلی گرم روی، ۶۶۰۰ میلی گرم منگنز، ۹۰۰ میلی گرم یود و ۳۰۰ میلی گرم سلنیوم می‌باشد.
  ۲. هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل: ۷۷۰۰۰ IU ویتامین A، ۳۳۰۰۰ IU ویتامین D3، ۶۶۰۰ میلی گرم ویتامین E، ۵۵۰ میلی گرم ویتامین K3، ۲۲۰۰ میلی گرم ویتامین B1، ۴۴۰۰ میلی گرم ویتامین B2، ۴۴۰۰ میلی گرم ویتامین B6، ۵۵۰۰ میلی گرم کلسیم پتوتان، ۲۲۰۰ میلی گرم نیاسین، ۱۱۰ میلی گرم اسیدفولیک، ۲۷۵۰۰ میلی گرم کولین کلاراید، ۱۲۵ میلی گرم آنتی اکسیدان، ۵۵۰۰ میکرو گرم بیوتین و ۸۸۰۰ میکرو گرم B12 می‌باشد.

## نتایج و بحث

در صد گرم) در پودر شفیره کرم ابریشم از اهمیت خاصی برخوردار است، همچنین حدود ۲۵ درصد چربی دارد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی و مشابهت دارد. در مطالعات قبلی گزارش شده که پودر شفیره کرم ابریشم دارای  $50/30$  درصد پروتئین خام و  $16/43$  درصد چربی خام می‌باشد که این می‌تواند دلیلی برای بالا بودن درصد عصاره فقد ازت باشد. همچنین فیر خام شفیره کرم ابریشم  $10/90$  درصد بود این نسبت بالای فیر خام احتمالاً به دلیل پوشش‌های خارجی حیوان باشد که از کیتین ساخته شده است می‌توان به عواملی مانند منبع، مرحله برداشت، روش فراوری و ذخیره‌سازی نسبت داد.

شفیره کرم ابریشم از محصولات جانبی صنعت تولید ابریشم می‌باشد، نتایج حاصل از تعیین ارزش غذایی پودر شفیره کرم ابریشم در مطالعه حاضر در جدول ۲ و ۳ گزارش شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پروتئین خام پودر شفیره کرم ابریشم بالایود و حدود ۵۶ درصد این ماده را تشکیل داده است، همچنین میزان چربی خام حدود  $26\%$  می‌باشد. میزان فسفر و کلسیم شفیره پایین و زیر ۱ درصد می‌باشد.

در مطالعه ای گزارش شد که محتوای مواد معدنی پودر شفیره کرم ابریشم  $1/25$  گرم در صد گرم بوده (Longvah و همکاران، ۲۰۰۱) و به نظر می‌رسد این ماده یک منع خوب از نظر فسفر، کلسیم و منیزیم باشد، محتوای بالای روی ( $7/24$  میلی گرم

جدول ۲: تجزیه تقریبی پودر شفیره کرم ابریشم

فیر خام، %	خاکستر، %	چربی خام، %	پروتئین خام، %	ماده خشک، %
$5/23 \pm 0/36$	$4/1 \pm 0/07$	$26/17 \pm 0/97$	$55/8 \pm 1/6$	$94/76 \pm 0/25$

میانگین  $\pm$  انحراف استاندارد (هر داده، میانگین ۳ تکرار آزمایشگاهی می‌باشد)

جدول ۳: اندازه‌گیری مواد معدنی پودر شفیره کرم ابریشم

کلسیم، %	پتاسیم، %	فسفر، %
$0/92 \pm 0/018$	$2/08 \pm 0/27$	$0/86 \pm 0/06$

میانگین  $\pm$  انحراف استاندارد (هر داده، میانگین ۳ تکرار آزمایشگاهی می‌باشد)

مختلف پودر شفیره کرم ابریشم قرار نگرفت ( $P < 0/05$ ). به طور کلی اندازه تخم مرغ به چگونگی تغذیه مرغ، وزن بدنه، سن، ژنتیک مرغ و برنامه نوری گله بستگی دارد. جیره‌های مورد استفاده در این آزمایش از نظر انرژی و پروتئین و سایر مواد معدنی مشابه بودند، لذا تاثیری از فاکتورهای تغذیه ای بر روی وزن تخم مرغ مشاهده نشد.

در گزارشات قبلی نتایج متناقضی از تاثیر شفیره کرم ابریشم بر تولید تخم مرغ در مرغ‌های تخمگذار گزارش شده است. در مطالعه ای که Khatun و همکاران (۲۰۰۵) در مرغ‌های

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر درصد تولید تخم مرغ (روز مرغ)، وزن تخم مرغ، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در جدول ۴ گزارش شده است. استفاده از سطوح مختلف شفیره کرم ابریشم تاثیر معنی داری بر میزان تولید تخم مرغ (روز مرغ) در کل دوره آزمایش نداشت ( $P > 0/05$ ). در واقع می‌توان گفت که به کاربردن پودر شفیره کرم ابریشم تا سطح  $12/5$  درصد در جیره مرغان تخمگذار، تاثیر منفی بر عملکرد تولیدی در مرغان تخمگذار نداشته است. میانگین وزن تخم مرغ در کل دوره آزمایش تحت تاثیر سطوح

تأثیر سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر مصرف خوراک معنی دار بود بطوریکه سطح ۱۰ درصد موجب افزایش معنی دار مصرف خوراک روزانه گردید و البته این افزایش در سطح ۱۲/۵ درصد شفیره مشاهده نشد. این احتمال وجود دارد که افزایش مصرف خوراک در این سطوح به دلیل کیتین موجود در این ماده باشد. کیتین باعث کاهش هضم غذای مصرفی می‌شود و نیاز به انرژی را بالا می‌برد. در موقعی که کمبود جزئی مقدار انرژی وجود دارد، پرنده می‌تواند با مصرف غذای بیشتر این کمبود انرژی را جبران نماید. به نظر می‌رسد این افزایش خوراک مصرفی در جهت جبران کمبود انرژی بدن باشد، این نتایج مطابق با یافته‌های سایر محققین بود (نقی و همکاران ۱۳۹۳)، Ijaiya و Eko (۲۰۰۹)، Jintasataporn (۲۰۱۲). البته افزایش معنی دار مصرف خوراک در سطح ۱۲/۵ درصد شفیره دیده نشد که توجیه نتایج را مشکل می‌سازد. کرم ابریشم که از شاه توت تغذیه کرده باشد در اثر تجزیه شفیره آن، حاوی بوی تنیدی می‌باشد که بدلیل حضور روغهای ضروری، فلاونوئیدها و ترپن‌ها در برگ شاه توت می‌باشد و ممکن است بر خوشخوارکی تاثیرگذار باشد (Finke, ۲۰۰۲). علی‌رغم این موضوع، مصرف خوراک به وسیله عوامل زیادی مانند سن، وزن پرنده، خوش خوارکی و کیفیت خوراک تحت تاثیر قرار می‌گیرد (Dewi و Setiohadi, ۲۰۱۰)، لذا عدم تاثیر منفی به کار بردن شفیره کرم ابریشم بر مصرف خوراک، می‌تواند نشان دهنده این باشد که خوشخوارکی تحت تاثیر قرار نگرفته است.

استفاده از ۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم منجر به افزایش مصرف خوراک در جوجه‌های گوشتی گردید (Jintasataporn, ۲۰۱۲). این محقق بیان کرد که شفیره کرم ابریشم حاوی کیتین می‌باشد و از آنجاکه قابلیت هضم مواد مغذی موجود در شفیره کرم ابریشم پایین است بنابراین وجود این ماده در جیره باعث کاهش هضم خوراک و درنتیجه آن خوراک بیشتری برای تأمین احتیاجات مورد نیاز مصرف می‌گردد، که استفاده از سطوح بالاتر (۱۰ و ۱۵ درصد در جیره) باعث کاهش مصرف خوراک در جیره جوجه‌های گوشتی شد.

تحمکنگار از سن ۲۸ تا ۴۵ هفتگی انجام دادند، گزارش کردند که تولید تخم مرغ و بازدهی خوراک (کیلوگرم خوراک به کیلوگرم توده تخم مرغ) در سطح ۶ درصد شفیره کرم ابریشم در جیره نسبت به گروه کنترل بهبود یافت اما در سطح ۸ درصد شفیره، تاثیر معنی داری مشاهده نشد که آنها پیشنهاد دادند پروتئین شفیره کرم ابریشم دارای کیفیت بالایی جهت استفاده در مرغهای تخمگذار است. همچنین وزن تخم مرغ و مصرف خوراک تحت تاثیر استفاده از شفیره کرم ابریشم در جیره قرار نگرفت. در تضاد با نتایج این محققین، Virk (۱۹۸۰) گزارش کرد که با افزایش سطح شفیره در جیره مرغان تخمگذار، تولید تخم مرغ کاهش یافته، اما وزن تخم مرغ و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر قرار نگرفته است. این محقق پیشنهاد کرد که شفیره کرم ابریشم حاوی برخی عواملی است که بر قابلیت هضم مواد مغذی، تاثیر منفی داشته و در تولید تخم مرغ منعکس شده است. همچنین در تحقیقی که Rahmasari و همکاران (۲۰۱۴) در مورد جایگزینی پودر ماهی با شفیره کرم ابریشم در بلدرچین انجام دادند گزارش کردند که جایگزینی پودر ماهی با شفیره کرم ابریشم موجب افزایش کل تولید تخم مرغ گردیده و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری بهبود یافته است.

در مطالعات پیشین گزارش شده که پودر شفیره کرم ابریشم دارای یک فاکتور محرك رشد ناشناس است، این ماده حاوی مقادیر زیادی اکدی استروئیدها به خصوص هورمون اکدیسون می‌باشد. اکدی استروئیدها در دگردیسی حشرات دخالت دارند و در فرایندهای فیزیولوژیک، سنتر پروتئین و به طبع آن در تشکیل بافت، مشابه هورمون‌های استروئیدی در رشد مرغ عمل می‌کنند، بنابراین ممکن است اکدی استروئیدهای حشرات بتوانند بدون تغییر به عنوان تحریک‌کننده رشد در مرغ عمل کند یا اینکه می‌تواند به دیگر استروئیدهای آنابولیک تبدیل شود (Fagoonee, ۱۹۸۳).

است. در مطالعه حاضر با توجه به بالا بودن وزن تخم مرغ در ۷/۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم و به طبع آن پایین تر بودن میزان مصرف خوراکی در تیمار ذکر شده درنتیجه ضریب تبدیل غذایی از نظر عددی بهبود یافته است.

به کار بردن ۷/۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم منجر به افزایش معنی دار توده تخم مرغ در مقایسه با گروه کنترل و سطح ۵ درصد پودر شفیره گردید ( $P \leq 0.05$ ) اختلاف در میانگین توده تخم مرغ را می توان به افزایش عددی (غیر معنی دار) درصد تولید تخم مرغ در تیمار ۷/۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم مرتبط دانست. همچنین با وجود اینکه در ابتدای دوره آزمایش، وزن بدن در تیمارهای آزمایشی، تقریباً یکسان و تفاوت معنی داری با همدیگر نداشتند، مرغ هایی که جیره حاوی ۷/۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم دریافت کردند وزن بدن بالاتری در پایان دوره آزمایش در مقایسه با تیمار کنترل داشتند ( $P \leq 0.05$ ).

ضریب تبدیل غذایی در مرغ های تخمگذار با میزان مصرف خوراک و مقدار تولید تخم مرغ مرتبط بوده و به عنوان شاخص مهمی جهت ارزیابی متغیرهای اعمال شده از طریق جیره غذایی و یا شرایط محیطی مورد توجه قرار می گیرد. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میانگین ضریب تبدیل خوراک در کل دوره آزمایشی تمایل به معنی داری نشان داده ( $P = 0.09$ )، به نحوی که تیمار ۷/۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم، ضریب تبدیل غذایی را نسبت به سطح ۱۰ درصد افزایش داده است. در مطالعه Mangisah و همکاران، (۲۰۰۴) مصرف خوراک در مرغان تخمگذاری که کل پودر ماهی موجود در جیره (۸ درصد جیره) با شفیره کرم ابریشم جایگزین شده بود به طور معنی داری کاهش و کمتر از گروهی بود که ۷۵-۲۵ درصد پودر ماهی جایگزین شده بود. همچنین جایگزینی پودر ماهی با شفیره کرم ابریشم تا سطح ۷۵ درصد، ضریب تبدیل مشابهی با گروه کنترل در مرغ های تخمگذار داشته

جدول ۵: تأثیر استفاده از شفیره کرم ابریشم بر وزن بدن، توده تخم مرغ و درصد تخم مرغ های غیر طبیعی

P-value	۱۲/۵ درصد شفیره	۱۰ درصد شفیره	۷/۵ درصد شفیره	۵ درصد شفیره	شاهد	تیمارهای آزمایشی
۰/۵۴	۱/۵۲±۰/۰۱	۱/۵۵±۰/۰۴	۱/۵۸±۰/۰۳	۱/۵۷±۰/۰۰۶	۱/۵۹±۰/۰۲	وزن مرغ (کیلو گرم، ابتدای دوره)
۰/۰۳	۱/۵۷±۰/۰۰۹	۱/۶۲±۰/۰۰۶	۱/۷۳±۰/۰۳	۱/۶۵±۰/۰۱	۱/۶±۰/۰۵	وزن مرغ (کیلو گرم، انتهای دوره)
۰/۰۵	۵۲/۲۲±۱/۷۶	۵۳/۹۴±۱/۲	۵۷/۶۲±۱/۳۴	۵۲/۲۲±۰/۸۴	۵۱/۹۸±۲/۰۳	توده تخم مرغ (گرم/روز/مرغ)
۰/۱۱	۱/۰۸±۰/۰۲	۰/۵۸±۰/۱۲	۰/۳۷±۰/۱۴	۱/۴۷±۰/۰۵	۱/۴۷±۰/۰۴۷	تخم مرغ های غیر طبیعی (%)

اعداد جدول عبارت اند از:  $X \pm SE$  (میانگین گروههای آزمایشی ± خطای استاندارد).

وجود حروف متفاوت در بین میانگین ها در هر ردیف بیانگر وجود اختلاف معنی دار است ( $P \leq 0.05$ ).

زرده به وسیله حضور رنگدانه گزانتوفیل ها، لوئشین، زاکسانتین، همچنین رنگدانه های سنتزی مانند کانتاگزانتین و استرهای آپوکاروتینیک تحت تاثیر قرار می گیرد. عدم تاثیر معنی دار استفاده از پودر شفیره کرم ابریشم بر کیفیت تخم مرغ، خود نتیجه مطلوبی بوده که نشان می دهد می توان از پودر شفیره کرم ابریشم به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره مرغ های تخمگذار تجارتی استفاده کرد.

در آزمایش حاضر تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر درصد تخم مرغ های شکسته، لمبه و غیر طبیعی نداشتند. نتایج حاصل از اندازه گیری صفات کیفی تخم مرغ در جدول ۶ گزارش شده است، همانطور که مشاهده می شود کیفیت فیزیکی تخم مرغ شامل شاخص زرده، شاخص شکل تخم مرغ، درصد وزنی پوسته، ضخامت پوسته تخم مرغ، واحد هاو، وزن مخصوص، وزن زرده، وزن سفیده و رنگ زرده تحت تاثیر استفاده از سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم در جیره قرار نگرفت (جدول ۶). رنگ

## نتیجه‌گیری

پروتئینی مناسب و اقتصادی همراه با کاهش قیمت تمام شده جیره (با توجه به اینکه قیمت پودر شفیره پایین تر از کنجاله سویا می باشد) استفاده کرد.

نتایج این آزمایش نشان داد که به کاربردن پودر شفیره کرم ابریشم تا سطح ۱۲/۵ درصد در جیره مرغان تخمگذار تجاری تاثیر منفی بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم مرغ ندارد و می‌توان به صورت کاربردی از پودر شفیره کرم ابریشم به عنوان یک منع

جدول ۶: میانگین صفات کیفی تخم مرغ در گروه‌های آزمایشی

P-value	۱۲/۵ درصد شفیره	۱۰ درصد شفیره	۷/۵ درصد شفیره	۵ درصد شفیره	شاهد	تیمارهای آزمایش
۰/۵۹	۵/۳۰ ± ۰/۱۳	۵/۲۷ ± ۰/۱۶	۵/۲۷ ± ۰/۱۷	۵/۱۱ ± ۰/۰۷	۵/۰۵ ± ۰/۱۰	وزن مخصوص (گرم)
۰/۱۷	۵/۵۸ ± ۰/۱۷	۵/۹۵ ± ۰/۱۶	۶/۰۷۵ ± ۰/۱۶	۵/۵۹۰ ± ۰/۰۸	۵/۷۰ ± ۰/۰۹	وزن پوسته (گرم)
۰/۱۷	۷۳/۹۷ ± ۱/۰۴	۷۳/۱۲ ± ۰/۶۷	۷۳/۸۸ ± ۰/۸۹	۷۱/۵۲ ± ۰/۴۴	۷۲/۰۸ ± ۰/۸۴	شاخص شکل (%)
۰/۵۱	۴۲/۷۲ ± ۰/۳۷	۴۳/۴۷ ± ۰/۲۳	۴۳/۳۶ ± ۰/۶۴	۴۲/۵ ± ۰/۴۳	۴۲/۵۷ ± ۰/۵۸	شاخص زرد (٪)
۰/۱۰	۸۱/۰۶ ± ۱/۱۱	۸۰/۹۹ ± ۱/۱۸	۸۳/۶۳ ± ۱/۸۱	۷۸/۰۵ ± ۰/۸۱	۸۰/۴۲ ± ۱/۳۶	واحد هاو
۰/۹۰	۳۶/۱۸ ± ۰/۷۰	۳۷/۰۰ ± ۰/۶۰	۳۶/۱ ± ۱/۲۲	۳۶/۶۰ ± ۰/۲۹	۳۶/۷۱ ± ۰/۱۷	ضخامت پوسته (میلی متر)
۰/۱۳	۱۸/۴۵ ± ۰/۲۴	۱۹/۴۸ ± ۰/۲۳	۱۹/۲۴ ± ۰/۲۷	۱۹/۲۷ ± ۰/۳۲	۱۸/۹۵ ± ۰/۲۸	وزن زرد (گرم)
۰/۶۱	۶/۷۲ ± ۰/۱۰	۶/۲ ± ۰/۰۲	۶/۵۵ ± ۰/۲۶	۶/۶۳ ± ۰/۱۴	۶/۵۲ ± ۰/۱۸	رنگ زرد (رش)
۰/۷۳	۳۷/۶۶ ± ۱/۲۷	۳۸/۱۰ ± ۱/۲۷	± ۰/۷۸ ۳۸/۵۵	۳۷/۳۰ ± ۰/۱۸	۳۶/۶۰ ± ۱/۳۸	وزن سفیده (گرم)

عداد جدول عبارت اند از:  $X \pm SE$  (میانگین گروه‌های آزمایشی  $\pm$  خطای استاندارد).

وجود حروف متفاوت در بین میانگین‌ها در هر ستون بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های مختلف آزمایشی است ( $P \leq 0.05$ ).

## منابع

- performance of broiler chickens fed with silkworm pupa (*Bombyx mori*). *Journal of Agricultural Science and Technology*. A, 2(4A): 505.
- Khatun, R., Azmal, S.A., Sarker, M.S.K., Rashid, M.A., Hussain, M.A. and Miah, M.Y. (2005). Effect of silkworm pupae on the growth and egg production performance of Rhode Island Red (RIR) pure line. *International Journal of Poultry Science*. 4(9):718-720.
- Longvah, T., Mangthya, K. and Ramulu, P. (2011). Nutrient composition and protein quality evaluation of eri silkworm (*Samia ricinii*) prepupae and pupae. *Food Chemistry*. 128(2): 400-403.
- Mangisah, L., Stiningdriati, E. and Sumarsih, S. (2004). The effect of fish meal substitution with pupae meal in a layer diet on feed consumption and egg production. *Journal of Indonesian Tropical Animal Science*. 29(1):39-43.
- Murthy, G.K., Rhea, V. and Peeler, T.J. (1971). Levels of antimony, cadmium, chromium, cobalt, manganese and zinc in institutional total diets. *Environmental Science and Technology*. 5:436-442.
- Patil, S.R., Amena, S., Vikas, A., Rahul, P., Jagadeesh, K. and Praveen, K. (2013). Utilization of silkworm larva and pupal waste- an ecofriendly approach for mass production of *Bacillus thuringiensis*. *Bio Resource Technology*. 131:545-547.
- Rahmasari, R., Sumiati. and Astuti D.A. (1971). The effect of silkworm pupae (*Bombyx mori*) meal to substitute fish meal on productive and physiological quality of quail egg. *Journal of Indonesian Tropical Animal Agriculture*. 39(3):180-187.
- نقدی، پ. (۱۳۹۳). اثرات به کارگیری سطوح مختلف شفیره کرم ابریشم در تغذیه طیور گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه.
- AOAC. (1995). Official methods of analysis, 16<sup>th</sup> Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA. pp:554, 556.
- Dewi, S.H.C. and Setiohadi, J.S. (2010). Pemanfaatan tepung pupa ulat sutera (*Bombyx mori*) untuk pakan puyuh (*Cortunix cortunix japonica*) janatan. *Journal of AgriSains*. 1(8):1-6.
- Dutta, A., Dutta, S. and Kumari, S. (2012). Growth of poultry chicks fed on formulated feed containing silk worm pupae meal as protein supplement and commercial diet. *Online Journal of Animal and Feed Research*. 2(3):303-307.
- Fagoonee, I. (1983). Possible growth factors for chickens in silkworm pupae meal. *British Poultry Science*. 24(3):295-300.
- Finke, M.D. (2002). Complete nutrient composition of commercially raised invertebrates used as food for insectivores. *Zoo Biology*. 21:269–285.
- Grobas, S., Mendez, J., Lazaro, R., De Blas, C. and Mateos, G.G. (2009). Influence of source and percentage of fat added to diet on performance and fatty acid composition of egg yolks of two strains of laying hens. *Poultry Science*. 80: 1171-1179.
- Ijaiya, A.T. and Eko, E.O. (2009). Effect of replacing dietary fish meal with silkworm (*Anaphe infracta*) caterpillar meal on growth, digestibility and economics of production of starter broiler chickens. *Pakistan Journal of Nutrition*. 8(6): 845-849.
- Jintasataporn, O. (2012). Production

Ravindran, V. and Blair, R. (1993). Feed resources for poultry production in Asia and the Pacific. III. Animal protein sources. *World's Poultry Science Journal.* 49(03):219-235.

Virk, R.S., Lodri, G.N. and Ichhpanani, J.S. (1980). Deoiled SWPM as a substitute for FM in white leghorn laying ration. *Indian Journal of Poultry Science.* 15:149-154.

